



Ficha Técnica

Ratanax Bloques

Rodenticida

Ratanax Bloques es un eficaz rodenticida anticoagulante de última generación, que mata rápidamente ratas, ratones y lauchas. Necesita sólo 1 dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 – 7 días de su ingestión. Por su tipo de formulación resiste la humedad.

❖ Modo de Acción

- 1- Asear el lugar y determinar las áreas de posible tránsito de roedores o signos de su presencia (heces, nidos, orina, etc.).
- 2- Colocar los bloques en portacebos (tubos de pvc) o estaciones de cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales silvestres, etc.) o niños.
- 3- Puede ser aplicado en cualquier época del año. Coloque 1 a 2 **Ratanax bloques**, cada 5 a 10 metros para RATAS o GUARENES, y cada 3 a 5 metros RATONES y LAUCHAS, en lugares más frecuentados por los roedores (bodega, desagües, entretechos, alcantarillas, botaderos). Puede ser aplicado en lugares de alta humedad. Repetir la dosis hasta notar que ha cesado el consumo.

❖ Uso

Ratanax Bloques puede ser utilizado en los lugares más frecuentados por roedores, tales como: desagües, entretechos, bodegas, alcantarillas, botaderos, etc.

❖ Precauciones importantes y almacenamiento

- Manténgase fuera del alcance de los niños, de personas no responsables y de los animales domésticos.
- Evite el contacto con la piel.
- Usar guantes para su aplicación y lavarse las manos con agua y jabón después de ésta.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- Asegúrese de aplicar el producto en lugares no accesibles a niños y animales domésticos y lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de los mismos.
- Eliminar los bloques no consumidos y destruir los envases vacíos.
- Entierre a los roedores muertos.



- Evitar que el producto tome contacto con fuentes de agua y animales. Este producto es extremadamente tóxico para mamíferos y vida silvestre, los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados.

❖ Síntomas de intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo y coagulación. Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones. IRRITACION OCULAR MODERADA.

En caso de ingestión involuntaria **NO** inducir al vomito y acudir a el centro médico asistencial más cercano llevando el envase del producto, allí se practicará un lavado estomacal.

❖ Precauciones de almacenamiento y conservación

No almacenar junto a pesticidas. Mantener alejado de niños, personas irresponsables y animales. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Fono Emergencia: 226353800 (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile).

Ratanax Bloques	
Composición	Brodifacoum 0,005% N° CAS (56073-10-0) Benzoato de denatonium 0,001% N° CAS (3734-33-6)
Duración	24 meses
Formatos	Caja 10 unidades / 100g
Registro ISP	N° P-633/22
Clase Toxicológica	Clasificación IV, Cuidado

Fabricado y distribuido en Chile por:

Productos Químicos Tanax S.A.C.e.I
Av. Américo Vespucio 01220
Quilicura, Santiago, Chile
Fono: 2273 91279
www.tanax.cl