

Insecticida

BIOVESP

Cebo para Chaqueta amarilla



Fórmula

Cada 100 g de producto contienen:

Espinosad.....4,76 g (CAS: 131929-60-7)

Otros componentes c.s.p.....100 g

Grupo químico: Espinosinas

Condición de venta: General.

Clasificación Toxicológica III, Ligeramente peligroso.

Contenido: 30g

Registro ISP N°: P-1061/25

Fabricado por: BTS Intrade Laboratorios S.A para Centro de Entomología Aplicada Ltda.

Distribuido por: BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358.

Pudahuel. Santiago de Chile.

Contacto: recepción@bts.cl. Fono: (56) 2 2749 8540. www.bts.cl

Descripción del producto

FICHA TÉCNICA BIODESP

BioVesp es un insecticida altamente efectivo diseñado específicamente para el control de la avispa chaqueta amarilla (*Vespula germanica*). Su ingrediente activo, espinosad, actúa como una potente neurotoxina, provocando la parálisis y posterior muerte de las avispas, tanto por contacto como por ingestión. **BioVesp** se distingue por su formulación a base de ingredientes proteicos, los cuales atraen de manera eficaz a las avispas y estimulan el consumo del producto. Esta característica permite el acarreo del cebo hacia la colonia, generando un efecto dominó que contribuye al control de la plaga incluso al interior del nido.

Este insecticida está indicado para su uso en exteriores, especialmente en áreas donde se detecte actividad de *Vespula germanica*, tales como jardines, patios y otros espacios al aire libre.

BioVesp es seguro para el medio ambiente y, cuando se utiliza conforme a las indicaciones, no afecta a las abejas ni a otros insectos polinizadores, ya que estos no se sienten atraídos por los componentes proteicos del cebo. Además, BioVesp ofrece una solución rápida y efectiva para proteger el hogar y el entorno frente a las molestias y riesgos asociados a la presencia de avispas, sin comprometer la seguridad de otras especies benéficas.

Forma de aplicación

Se recomienda aplicar el cebo en el exterior de las construcciones, tales como jardines, patios y en todos aquellos lugares donde se observe actividad de avispas chaqueta amarilla.

El cebo debe colocarse amarrado o suspendido a una altura no inferior a 1,5 metros del suelo. Las estaciones con cebo deben instalarse a una distancia aproximada de 20 a 30 metros del nido, en los perímetros de los sectores afectados, o bien en zonas cercanas a fuentes de agua, áreas de alimentación o parcelas vecinas, especialmente cuando se sospeche que el nido se encuentra en dichas áreas.

El mejor momento para comenzar a utilizar BioVesp es cuando se observe que las avispas se acercan a los alimentos. Se recomienda instalar las estaciones temprano en la mañana, momento en que inicia la actividad de forrajeo.

Se recomienda colocar 10 estaciones de cebo por hectárea. La reposición del cebo debe realizarse cada 24 a 48 horas, revisando su consumo al menos cada 24 horas. Durante este período, es posible aplicar una pequeña cantidad de agua para rehidratar el cebo y mantenerlo activo por algunas horas adicionales, ya que el cebo pierde su atracción cuando se seca.

- La preparación del cebo debe realizarse en un lugar cerrado, con el fin de evitar picaduras durante su manipulación.
- Este cebo puede resultar atractivo para perros y gatos, por lo que debe colocarse en lugares donde las mascotas no tengan acceso.


Dosis:

La dosis recomendada de BioVesp es de 30 g de producto en 70 mL de agua. La mezcla debe presentar una consistencia homogénea tipo puré, adecuada para su correcta atracción y consumo por parte de las avispas.

Época del año:

El cebo puede utilizarse durante todo el año; no obstante, su mayor eficacia se presenta a fines del verano y en otoño, cuando la colonia de *Vespula germanica* alcanza su máximo desarrollo y aumenta la búsqueda de alimentos proteicos, favoreciendo el consumo del cebo, su acarreo al nido y un mejor control de la plaga.

Tiempo de control de colonia: 8 a 48 horas luego del consumo.



Precauciones de almacenamiento

- Para la aplicación se recomienda el uso de guantes para no contaminar el cebo.
- No comer, fumar o beber durante la manipulación del producto.
- No aplicar este producto sobre animales domésticos.
- Producto tóxico para organismos acuáticos y la vida marina, no elimine a cursos de agua.
- Colgar el producto a 1,5 metros de altura o más para evitar el acceso de niños, aves y mascotas.
- Elimine el envase de forma segura, no reciclar, elimine como desecho toxico en vertedero autorizado.
- Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.

Tiempo de reingreso: Inmediatamente después de la aplicación.

Síntomas de intoxicación

Dolor abdominal, náuseas y vómitos, mareos, diarrea. Por inhalación; irritación de vías respiratorias, tos, dificultad para respirar. Contacto dérmico: Irritación de la piel, enrojecimiento, picazón.

Primeros auxilios

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antidoto

No posee, solo tratamiento sintomático.