

Rodenticida natural

Rodol

Pellet



Fórmula

Celulosa derivada del maíz81,3 g (N° CAS 68525-86-0)
Otros componentes c.s.p.....100 g

Grupo químico: Polisacárido.

Condición de venta: General.

Clasificación Toxicológica III: Ligeramente peligroso.

Presentación: Caja 4kg - Peso sachet: 25g.

Registro ISP N°: P-1043/25

Fabricado y distribuido por: BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel. Santiago de Chile.
Contacto: recepcion@bts.cl. Fono: (56) 2 2749 8540.
www.bts.cl.

* Foto de producto referencial.

>>> Para más información visítanos en www.bts.cl

Descripción del producto

FICHA TÉCNICA

Rodol Pellet

Rodol Pellet es un innovador cebo en formato pellet, desarrollado para el control eficaz de roedores a través de una acción natural, segura y libre de sustancias tóxicas. Su ingrediente activo principal es celulosa derivada del maíz, un componente que los roedores no pueden digerir adecuadamente. Esto provoca una alteración intestinal progresiva que desencadena la muerte del animal entre los tres y siete días posteriores al consumo continuo, sin generar alerta dentro de la colonia.

La formulación de Rodol Pellet incluye además, cereales, grasas vegetales y agentes endulzantes naturales, cuidadosamente seleccionados para asegurar una alta palatabilidad y aceptación por parte de las especies objetivo.

Gracias a su composición libre de venenos, Rodol Pellet no representa riesgos para personas, mascotas, animales de producción ni fauna no objetivo. Al no contener ingredientes anticoagulantes ni tóxicos, no deja residuos contaminantes en el ambiente ni en los cadáveres de los roedores, lo que lo convierte en una alternativa ideal para el control en entornos sensibles como hospitales, colegios, industrias alimentarias, bodegas y espacios urbanos.

Rodol Pellet es una solución moderna y sustentable para el manejo de roedores, que combina efectividad, seguridad y responsabilidad ambiental.

Forma de aplicación

Producto listo para usar. Puede ser aplicado en cualquier época del año. Primero determine las posibles áreas de tránsito de roedores. Distribuya los sachets en los lugares frecuentados por esta plaga utilizando cajas o tubos cebadores. Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo.

Dosis recomendada:

Peso del cebo: 25g.

PLAGA A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén o Rata de alcantarilla), <i>Rattus rattus</i> (Rata de Tejado).	2 a 4 Sachet / 5 a 10 metros lineales
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha).	1 a 2 Sachet / 3 a 5 metros lineales

Precauciones

- Este producto debe ser aplicado por adultos.
- No beber, fumar o comer durante su aplicación.
- Procure no manipular directamente el producto con las manos. Utilice guantes, ya que olores indeseables pueden disminuir el atractivo del producto (tabaco, perfume del jabón, etc.).
- Lávese las manos con agua y jabón después de su uso.
- Asegúrese de instalar los cebos raticidas en lugares no accesibles para niños, animales y lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de éstos.
- Almacene en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperatura ambiente.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Tiempo de reingreso: Inmediatamente después de la aplicación.

Síntomas de intoxicación

Rodol Pellet es una formulación no tóxica y no genera amenaza en caso de envenenamiento. En caso de ingesta accidental puede causar dolor abdominal y constipación.

Primeros Auxilios

- **Contacto con la piel:** Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.
- **Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.
- **Inhalación:** Debido a la formulación del producto, la inhalación es poco probable que ocurra. Lleve a la persona a un área con aire fresco. Consulte a un médico.

Antídoto

Tratamiento sintomático. La ingesta accidental del producto por niños o mascotas debe ser tratada con laxantes, agua y electrolitos.