

INSTITUTO SANITAS S.A.-CHEMOPHARMA S.A.
Avda. Américo Vespucio Nro. 01260- Quilicura, Santiago
Tel. +562 22 444 6600
Mail: sanitas@sanitas.cl –
chemopharma@chemopharma.cl

Sanitas®

RESUMEN

FECHA DE FEICHA	NOMBRE DEL PRODUCTO	PREPARADO POR:	REVISADO POR:
08 de abril de 2019	REPELEX ® FORTE AEROSOL	Gabriela Soto	Juan Freddy Aravena (Q.F.)

FINALIDAD DE USO

Repelente de insectos. Proporciona aproximadamente 12 horas de protección.
Clasificación: Producto Cosmético. Protección contra el Dengue, efectivo sobre mosquitos Aedes Aegypti.

COMPOSICIÓN

COMPONENTES

DEET 30%

Excipientes: Glicerol, perfume fantasía, etanol, alcanfor, propelentes.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MEDICAMENTO

CONTRAINDICACIONES

- Alergia conocida a Dietiltoluidamida. (DEET). Si sospecha de una reacción alérgica a este producto, deje de usarlo inmediatamente, lávese la piel tratada y llame al Centro de control de envenenamientos local.
- Al aplicar por primera vez, se recomienda aplicar una pequeña porción en el antebrazo. En caso de aparecer enrojecimiento o ardor, indica que el producto no puede ser usado en esa persona.
- No aplicar sobre piel dañada o irritada.
- No debe ser administrado a menores de 2 años.

PRECAUCIONES-ADVERTENCIAS

- **Inflamable.** No pulverizar cerca de llama: No perforar ni incinerar. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a los 50°C. Proteger los ojos durante la aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. No arrojar al incinerador o al fuego. Prohibido su relleno. No aplicar sobre o cerca de: acetato, rayón, spandex u otros sintéticos (excepto nylon), muebles, plásticos, cristales de reloj, cuero o superficies pintadas o barnizadas. No exponga las superficies tratadas a la cercanía del fuego o llamas. No perforar, no ingerir. Úsese sólo para su uso específico
- Se recomienda no exponer en forma inmediata la piel al sol, luego de la aplicación.

MODO DE EMPLEO / POSOLOGÍA

Recomendaciones de uso.

- Usar la cantidad adecuada de repelente para cubrir la piel expuesta o la ropa.
- No aplicar repelente en la piel que está cubierta por ropa. No es necesario aplicar grandes cantidades para lograr una buena protección.
- No aplique repelente en cortes, heridas, ni piel irritada.
- Cuando vuelva al interior de la vivienda lávese la zona de la piel tratada con agua y jabón.
- No rocíe usando aerosoles o sistemas similares en áreas cerradas.
- No rocíe usando aerosoles o sistemas directamente a la cara. Rocíelo primero en las manos y luego aplique el producto con cuidado en la cara sin tocar los ojos ni la boca.

USO EN NIÑOS

Se recomienda a los padres que elijan el tipo y la concentración del repelente teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que el niño pasará al aire libre, la exposición a los mosquitos y el riesgo de contraer enfermedades Transmitidas por mosquitos en esa zona. Las personas preocupadas por el uso de DEET u otros productos en niños, debería consultar con su médico.

- Cuando use repelentes en un niño, aplíquelo con sus propias manos y luego póngalo en el niño. Evite los ojos y la boca del niño, y no ponga mucha cantidad en las orejas.
- No aplique el repelente en las manos del niño. (Los niños tienden a meterse las manos en la boca)
- No permita que los niños pequeños se apliquen ellos mismos el repelente: siempre lo debe hacer un adulto. Mantenga los repelentes fuera del alcance de los niños.
- No aplique el repelente en zonas de la piel que van a estar cubiertas por la ropa. Si aplica repelente en la ropa, lávela antes de que se vuelva a usar.
- Si va al médico, lleve el producto. Los casos de reacciones graves a productos que contienen DEET están relacionados con el uso incorrecto del producto, por ejemplo, al tragarlo, usando sobre heridas y usarlo varios días sin lavarse la piel después de cada uso. Siga siempre las instrucciones que aparecen en la etiqueta del producto.

EFFECTOS COLATERALES/ ADVERSOS

- No se ha informado sobre posibles efectos adversos en mujeres embarazadas o que estén amamantando si los repelentes que contienen DEET se han usado correctamente.
- En ocasiones excepcionales estos productos pueden causar reacciones alérgicas en la piel. Si sospecha que está reaccionando a este producto, deje de usarlo inmediatamente, lávese la piel tratada y llame al centro de control de envenenamientos local.

PRESENTACION Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Mantener en su envase original, almacenar a no más de 30 °C
- No exponer al sol, ni temperaturas superiores a los 50°C.

Presentación: Envase aerosol, envasado a presión.

Período de eficacia: 36 meses

OTRA INFORMACIÓN

SOBREDOSIS Y PRIMEROS AUXILIOS. En caso de ingestión accidental, ***no inducir el vómito*** y consultar al médico de inmediato, portando el envase o el rótulo del producto. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 10 a 15 minutos. ***En caso de inhalación, llevar al paciente al aire libre y consultar al médico.***

La ingestión de DEET produce efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y malestar general que pueden ser seguidos de efectos sistémicos en caso de que la ingestión sea muy elevada. En estos casos, transcurridos 0.5 a 6 horas pueden desarrollarse alteraciones de los niveles de conciencia, hipotensión, taquicardia, convulsiones y depresión respiratoria.

La exposición a la piel provoca eritema, infección y dermatitis.

Consultas en caso de intoxicación: Centro de Intoxicaciones toxicológicas de la Universidad Católica de Chile CITUC: Fono: (+56) 226353800

Registro ISP Nro. 823C-6/16

PRODUCTOS COSMÉTICO

Titular de la autorización: INSTITUTO SANITAS S.A. (Avda. Américo Vespucio Nro. 01260-Quilicura, Santiago-Chile),
Teléfono: (+56) 22 444 6600

Fabricado por IRIS S.A.I.C., Paraguay.

Importado y distribuido en Chile por INSTITO SANITAS S.A.

DATOS TÉCNICOS LOGÍSTICOS

GTIN	Descripción	Contenido	Envase	Alto	Ancho	Fondo	Peso Bruto
7800038046307	REPELEX FORTE AEROSOL	165 cm3	Lata cilíndrica	19,8	4,4	4,4	180,0
17800038046304	REPELEX FORTE AEROSOL	12 latas cilíndricas	Termocontra	19,8	13,3	18,0	2160,0